

medycznej i dostępnych metod leczenia dzieci, powinno się wybierać najbardziej bezpieczne leki i drogi podawania leków: czyli droga doustna realizowana w warunkach ambulatoryjnych, a tym bardziej w warunkach domowych, a w przypadku przeciwwskazań – droga dożylna, stosowana w warunkach szpitalnych – niezależnie od produktu leczniczego”,

- z dn. 12.08.2018 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych.


Przytaczane stanowiska i opinie mają jasny przekaz – dobro dziecka jest najważniejsze, nieuzasadnione jest zlecanie antybiotyków drogą domięśniową u tych dzieci, narażanie na ból, możliwość powikłań (uszkodzenie nerwu kulszowego, uszkodzenie mięśni pośladkowych, do zaników włócznie jak również możliwość wystąpienia reakcji alergicznych od wysypki uczuleniowej do wstrząsu anafilaktycznego włócznie). O możliwych zdarzeniach niepożądanych powinni być poinformowani opiekunowie dziecka.

Pielęgniarka, położna przed wykonaniem zlecenia ocenia również ryzyko tych powikłań.

Ustawa z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z póź. zm.) w art. 12 ust. 2 mówi: „pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz innego świadczenia lekarskiego, niezgodnego z jej sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie na piśmie swojemu przełożonemu lub osobie zlecającej przyczynę odmowy” o odmowie wykonania zlecenia ambulatoryjnie lub w domu chorego informuje rodziców dziecka. Rodzice w takiej sytuacji powinni udać się do lekarza w celu zmiany metody leczenia. Lekarz może uwzględnić wątpliwości pielęgniarki i zmienić zlecenie lub je podtrzymać.

Data 11.12.2018

Podpis Konsultanta Wojewódzkiego

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
dla województwa kujawsko-pomorskiego

dr n. med. Alicja Przybysz